



Réseau de  
Périnatalité  
Occitanie




# CLASSEUR TRANSFERTS

**RÉSEAU DE PÉRINATALITÉ OCCITANIE**

- ÉDITION 2024 -

**N°Unique 08h - 20h (7j/7j) : 09 70 75 30 50**

**Procédures / Aide à la décision**  
**Fiches et outils**  
**Protocoles**



## INFORMATIONS AVANT UTILISATION

Ce classeur regroupe et permet le téléchargement de plusieurs outils d'aide à la décision d'un transfert périnatal.

Ces informations compilées sont le fruit d'un travail de réflexion mené par le Réseau Périnatal Occitanie en concertation avec des professionnels de santé impliqués directement dans la thématique des transferts.

Les réseaux Maternip, Ptit Mip et NGLR ont contribué à ce que leurs travaux fusionnent et se complètent dans ce document synthétique et pratique.

Ce travail n'est pas définitif et évoluera avec les organisations et réglementations. Il a pour objectif d'aider rapidement les professionnels de santé du terrain à s'organiser pour la bonne conduite d'un transfert périnatal sans pour autant se substituer à la compétence et l'autonomie des personnels médicaux en charge des transferts quotidiennement.

### ***Le Pôle Transferts RPO***

Si vous souhaitez faire profiter le réseau de vos commentaires, ajouts, remarques sur ces outils, veuillez nous contacter :

- Par mail : [transfertsRPO@perinatalite-occitanie.fr](mailto:transfertsRPO@perinatalite-occitanie.fr)
- Par téléphone : **09 70 75 30 50**

## UNE VIDÉO POUR MIEUX PRÉPARER UN TRANSFERT

Votre patiente hospitalisée et son futur enfant ont besoin de soins spécialisés ? Votre maternité est saturée ? Un transfert s'impose ? Le pôle Transferts du Réseau de Périnatalité Occitanie a réalisé une vidéo vous permettant de suivre pas à pas toutes les étapes nécessaires afin de réaliser un transfert.

**Vous pouvez accéder à la vidéo en scannant le QR Code ou en cliquant sur la vignette de la vidéo.**



# Sommaire

## PDF Interactif

Vous pouvez accéder directement à la partie que vous souhaitez consulter en cliquant sur les titres.

## P.4 - ALGORITHME TRANSFERT

### P.5 - PROCÉDURES

#### P.6 - PROCÉDURE - TRANSFERT IN UTERO

P.6 - I - J'ai besoin de transférer une patiente

P.7 - II - Je suis sage-femme en SDN de type III je reçois un appel d'un établissement demandeur en dehors des heures d'ouverture de l'équipe transferts

#### P.8 - PROCÉDURE - TRANSFERT POUR PATHOLOGIE MATERNELLE DU POST-PARTUM

#### P.9 - PROCÉDURE - RAPPROCHEMENT MÈRE-ENFANT

P.9 - I - Procédure d'appel

P.9 - II - Les documents à remplir

P.9 - III - Avant le départ de la patiente

#### P.10 - AIDE A LA DÉCISION DE LA CLASSE DE VECTEURS POUR LES TRANSFERTS PÉRINATAUX

P.10 - I - Définitions

P.11 - II - Risque d'accouchement prématuré à membranes intactes (sans métrorragies)

P.12 - III - Rupture prématurée des membranes avant 36 SA

P.13 - IV - Métrorragies - Hémorragie du post-partum Anomalie de l'insertion placentaire

P.14 - V - Prééclampsie

#### P.15 - PROCÉDURE - ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES LIÉS A L'ACTIVITÉ DES SOINS

P.15 - I - Objet de la procédure

P.15 - II - Définitions

P.16 - III - Procédure de déclaration

P.16 - IV - Procédure de traitement des EIAS

### P.17 - FICHES ET OUTILS

P.18 - Fiche de liaison transfert in utero

P.18 - Fiche de liaison transfert post partum pour pathologie maternelle

P.19 - Fiche de liaison « Rapprochement Mère-Enfant »

P.19 - Fiche de consentement transfert

P.20 - Fiche simplifiée de recueil d'informations

P.20 - Check list transfert

P.21 - Aide-mémoire pour le conditionnement des patientes avant TIU

P.21 - Mémo - annuaire des maternités en Occitanie et hors-région Occitanie pour l'aide aux transferts

P.22 - Enquête de satisfaction des patientes

P.22 - Lettre d'information à destination des patientes lors des périodes de suractivité

P.23 - Carte des maternités d'Occitanie

### P.24 - PROTOCOLES ET PROCÉDURES

P.25 - Procédure transfert complexe par manque de place

P.25 - Référentiel - Transferts pour hémorragies du post partum

P.26 - Référentiel pour l'orientation des patientes confirmées d'infection COVID-19 en maternité dans l'Occitanie

P.26 - Référentiel métrorragies et transferts pendant la grossesse

P.27 - Référentiel rupture prématurée des membranes et transfert

P.27 - Référentiel transfert pour pathologie vasculaire placentaire

P.28 - Référentiel transfert In Utero et menace d'accouchement prématuré

P.28 - Lettre d'information à destination des patientes lors des demandes de RME

P.29 - Lettre d'information à destination des patientes lors des demandes de RME (CHU Montpellier)

P.29 - Lettre d'information à destination des patientes lors des demandes de RME (CH Perpignan)

P.30 - Lettre d'information à destination des patientes lors des demandes de RME (CHU Nîmes)


P.30 - Lettre d'information à destination des patientes lors des demandes de RME (CHU Toulouse)



## PDF Interactif

Vous pouvez à tout moment revenir au sommaire en cliquant sur ce visuel.

# ALGORITHME TRANSFERT





# PROCÉDURES

# PROCÉDURE - TRANSFERT IN UTERO

**Rappel définition :** le transfert in utero (TIU) est indiqué lorsqu'il existe une inadéquation entre la structure d'hospitalisation d'une femme enceinte et la pathologie qu'elle ou son enfant présente.

## **RAPPEL des CONTRE INDICATIONS au TRANSFERT IN UTERO (à discuter en équipe)**

- ✓ HRP ou suspicion d'HRP.
- ✓ Travail avancé (plus de 4cm de dilatation) et / ou risque majeur d'accouchement pendant le transport.
- ✓ Anomalies du RCF en faveur d'une souffrance fœtale aiguë incompatible avec un TIU.
- ✓ Etat maternel incompatible avec un TIU (syndrome hémorragique, éclampsie, choc septique).

## ► I - J'ai besoin de transférer une patiente

### **A - Un seul numéro d'appel : le 09 70 75 30 50**

En journée 7/7 de 8h à 20h : la sage-femme du réseau vous aide à organiser le transfert de la patiente. Dans le cas particulier des retransferts (patient transférée vers un établissement de type adapté plus proche de son domicile) : si la distance est >150 km aller, une demande d'entente préalable doit être faxée à la CPAM.

**En dehors de ces horaires :** un répondeur vous oriente vers la sage-femme de la salle de naissance (SDN) de l'établissement de type III le plus proche de votre établissement :

- **Tapez 1** pour être mis en relation avec le **CH de Perpignan**.
- **Tapez 2** pour être mis en relation avec le **CHU de Nîmes**.
- **Tapez 3** pour être mis en relation avec le **CHU de Montpellier**.
- **Tapez 4** pour être mis en relation avec le **CHU de Toulouse** (gynécologue de garde).
- **Tapez 5** pour laisser un message au **RPO**.
- Le gynécologue-obstétricien (GO) qui demande le transfert appelle le **09 70 75 30 50**
- La SF de SDN du type III le plus proche reçoit l'appel, prévient le GO de garde de son établissement qui prend l'appel (ou lui transfère l'appel, cette procédure permettant l'enregistrement de la conversation).
- Les deux médecins discutent de la situation médicale et du lieu de destination de la patiente.
- Pour les maternités de l'ex Midi-Pyrénées, le GO du CHU de Toulouse valide l'indication et la faisabilité uniquement vers le type 3 de Toulouse. Le cas contraire, le demandeur doit trouver une place vers un établissement adapté (type2, autre type3) **(en date du 22/07/22)**.
- Après s'être assuré d'absence de contre-indications et d'une disponibilité de place en obstétrique, le GO du type III prévient le pédiatre sénior de son établissement, du transfert.
- Si manque de place, l'équipe du type III aide à l'orientation de la patiente, en sollicitant le SAMU si besoin.
- Quand une place est trouvée et après concertation avec l'équipe transfert (en journée) ou avec le médecin receveur, le demandeur du transfert contacte un transporteur. En cas de transport médicalisé (classe 3) ou de doutes sur le type de transport, le médecin demandeur du transfert appelle le 15 pour s'entretenir avec le médecin du SAMU, qui peut organiser une conférence à trois avec le médecin receveur. Selon l'indication et l'état clinique de la patiente, un transport médicalisé peut être décidé. ([Vecteurs](#)).
- En cas de transport médicalisé, le SAMU déclenche le transport.
- Si un transport non médicalisé est décidé : l'établissement demandeur mobilise une ambulance privée, le SAMU pouvant être sollicité en cas de difficulté.



**Le RPO ayant pour objectif de réaliser un recueil exhaustif des transferts, merci de tracer tout transfert par :**

- Mail à [transfertsRPO@perinatalite-occitanie.fr](mailto:transfertsRPO@perinatalite-occitanie.fr)
- Message sur le répondeur (tapez 5)
- Fax au **09 71 04 57 64**

Je signale au RPO toute difficulté par mail à [transfertsRPO@perinatalite-occitanie.fr](mailto:transfertsRPO@perinatalite-occitanie.fr) et tout évènement indésirable au lien suivant (copier coller le lien dans votre navigateur) : <https://www.perinatalite-occitanie.org/form/index.php/795865?newtest=Y&lang=fr> ou en remplissant la fiche de déclaration d'EIAS ([Procédure EIAS](#)).

## **B - Documents à remplir**

- **Fiche de liaison TIU ([Fiche Liaison TIU](#))** : signée par le médecin demandeur, elle peut se substituer au courrier de transfert).
- **Fiche de consentement et d'information** signé par la patiente ([Consentement](#)).
- **Désignation de la personne de confiance** (copie du document interne de votre établissement).
- **Check-list recapitulative ([Checklist](#))**.

## **C - Conditionnement de la patiente**

- Un aide-mémoire est disponible ([Conditionnement](#))
- La situation clinique de la patiente pouvant évoluer, l'équipe demandeuse du transfert s'engage à signaler à l'équipe receveuse et au SAMU tout nouvel élément (ainsi qu'à la SF RPO en heures ouvrées).
- Juste avant son départ, la patiente est systématiquement réévaluée. Ces informations sont tracées dans le cadre prévu à cet effet de la fiche de liaison TIU ([Fiche Liaison TIU](#)).
- Prévenir l'établissement receveur (le RPO en journée) du départ de la patiente.

## **► II - Je suis sage-femme en SDN de type III je reçois un appel d'un établissement demandeur en dehors des heures d'ouverture de l'équipe transferts**

**Je suis la procédure suivante, en notant idéalement l'heure de chaque appel :**

- Je reçois l'appel, je recueille les informations ([cf. fiche simplifiée de recueil d'informations](#)) et préviens le GO de garde de mon établissement qui vient prendre l'appel (cette procédure permet l'enregistrement de la conversation).
- Les deux médecins discutent de la situation médicale et du lieu de destination de la patiente.
- Après s'être assuré d'une disponibilité de place en obstétrique, le GO de mon établissement prévient le pédiatre senior du transfert.
- Pour évaluer la probabilité d'accouchement dans les 48h, et avant 34 SA, je peux m'appuyer sur le score suivant : <http://www.perinatology.com/calculators/TRANSFER.htm>
- En cas de manque de place, j'aide à l'orientation de la patiente, en sollicitant le SAMU si besoin.
- Quand une place est trouvée, et après concertation avec le médecin receveur, c'est au demandeur du transfert de contacter un transporteur. En cas de transport médicalisé (classe 3) ou de doutes sur le type de transport, le médecin demandeur du transfert appelle le centre 15 pour s'entretenir avec le médecin régulateur du SAMU, qui peut organiser une conférence à trois avec le médecin receveur (enregistrée par le SAMU). Selon l'indication et l'état clinique de la patiente, un transport médicalisé ou non peut être décidé. ([Vecteurs](#)).
- En cas de transport médicalisé, le SAMU déclenche le transport.
- Si un transport non médicalisé est décidé : l'établissement demandeur mobilise une ambulance privée, le SAMU pouvant être sollicité en cas de difficulté.

Je signale au RPO toute difficulté par mail à [transfertsRPO@perinatalite-occitanie.fr](mailto:transfertsRPO@perinatalite-occitanie.fr) et tout évènement indésirable au lien suivant (copier coller le lien dans votre navigateur) : <https://www.perinatalite-occitanie.org/form/index.php/795865?newtest=Y&lang=fr> ou en remplissant la fiche de déclaration d'EIAS ([Procédure EIAS](#)).



# PROCÉDURE - TRANSFERT POUR PATHOLOGIE MATERNELLE DU POST-PARTUM

## A - Un seul numéro d'appel : le 09 70 75 30 50

7/7 de 08h à 20h : la sage-femme du réseau vous aide à organiser le transfert de la patiente. La priorité sera donnée aux HPP et prééclampsies.

En dehors de ces horaires : Il s'agit d'une situation à haut risque. La présence des médecins GO et anesthésiste étant vivement encouragée, ainsi que leur mise en conférence rapide, **penser à contacter très rapidement le médecin régulateur du SAMU.**

Les médecins des centres demandeurs (gynécologue-obstétricien et anesthésiste) appellent le centre 15 qui organise une conférence avec les médecins GO et anesthésiste receveurs (conversation enregistrée). Le médecin régulateur du SAMU déclenchera le transport.

Le RPO ayant pour objectif de réaliser un recueil exhaustif des transferts périnataux, merci de tracer tout transfert par mail à [transfertsRPO@perinatalite-occitanie.fr](mailto:transfertsRPO@perinatalite-occitanie.fr) ou en laissant un message sur le répondeur.

Je signale au RPO toute difficulté par mail à [transfertsRPO@perinatalite-occitanie.fr](mailto:transfertsRPO@perinatalite-occitanie.fr) et tout événement indésirable au lien suivant (copier coller le lien dans votre navigateur) : <https://www.perinatalite-occitanie.org/form/index.php/795865?newtest=Y&lang=fr> ou en remplissant la fiche de déclaration d'EIAS ([Procédure EIAS](#)).

## B - Documents à remplir

- Fiche de liaison TPP ([Fiche Liaison TPP](#)), impérativement accompagnée de la copie de la fiche de surveillance HPP le cas échéant.
- Fiche d'information et de consentement RPO signée par la patiente ([Consentement Patiente](#)).
- Désignation de la personne de confiance (copie du document interne de votre établissement).
- Check-list recapitulative ([Checklist](#)).

## C - Conditionnement de la patiente

- La situation clinique de la patiente pouvant évoluer, l'équipe demandeuse du transfert s'engage à signaler à l'équipe receveuse et au SAMU tout nouvel élément.
- Juste avant son départ, la patiente est systématiquement réévaluée. Ces informations sont tracées dans le cadre prévu à cet effet de la fiche de liaison TPP ([Fiche Liaison TPP](#)).
- L'établissement receveur et le RPO sont avisés du départ de la patiente et de l'arrivée approximative du SAMU.



# PROCÉDURE - RAPPROCHEMENT MÈRE-ENFANT

**Rappel définition :** Un rapprochement mère-enfant (RME) est nécessaire lorsqu'un nouveau-né est transféré dans un autre établissement que son lieu de naissance. Le RME évite la séparation et permet le maintien du lien mère-enfant. Attention, le transfert du nouveau-né est réalisé indépendamment du transfert maternel. Dans le cas d'une complication maternelle associée (HPP, HELLP syndrome, ...), c'est la procédure « Transfert post-partum pour pathologie maternelle » qui s'applique ([Procédure TPP](#)).

## ► I - Procédure d'appel

### A - En journée de 08h - 20h

J'appelle le **09 70 75 30 50**. La sage-femme RPO organise le rapprochement de la patiente auprès de son enfant. Idéalement, la demande est effectuée dans ces plages horaires afin de ne pas surcharger les équipes de nuit.

### B - En dehors de ces horaires

- Le GO de l'établissement demandeur valide la faisabilité du RME.
- La SF en charge de la patiente dans l'établissement demandeur contacte l'établissement dans lequel la patiente est susceptible d'être transférée (cf Coordonnées).
- Après s'être assurée d'une place disponible, et avoir obtenu l'accord du GO de garde, la SF de l'établissement receveur recueille les informations.
- Sauf exception, le transport sera non médicalisé (classe I) : c'est l'établissement demandeur qui se charge d'appeler une ambulance privée, le SAMU pouvant être sollicité en cas de difficulté.

Attention, en cas d'état très critique ou de décès imminent de l'enfant, le RME sera appuyé par l'équipe du RPO conformément à la charte du nouveau-né hospitalisé : <https://www.gouvernement.fr/actualite/la-chartre-du-nouveau-ne-hospitalise>

**Le RPO ayant pour objectif de réaliser un recueil exhaustif des transferts, merci de tracer tout transfert par :**

- Mail à [transfertsRPO@perinatalite-occitanie.fr](mailto:transfertsRPO@perinatalite-occitanie.fr)
- Message sur le répondeur (tapez 5)
- Fax au **09 71 04 57 64**

Je signale au RPO toute difficulté par mail à [transfertsRPO@perinatalite-occitanie.fr](mailto:transfertsRPO@perinatalite-occitanie.fr) et tout évènement indésirable au lien suivant (copier coller le lien dans votre navigateur) : <https://www.perinatalite-occitanie.org/form/index.php/795865?newtest=Y&lang=fr> ou en remplissant la fiche de déclaration d'EIAS ([Procédure EIAS](#)).

## ► II - Les documents à remplir

- Fiche de liaison RME ([Fiche liaison RME](#)) : signée par le médecin demandeur ainsi que la SF, elle peut se substituer au courrier de transfert.
- Dossier médical de la patiente (bilans, CR accouchement, observation cliniques)
- Fiche d'information et consentement du RPO signé par la patiente ([Consentement Patient](#)).
- Désignation de la personne de confiance (copie du document interne de votre établissement).
- Check-list recapitulative ([Checklist](#)).

## ► III - Avant le départ de la patiente

Juste avant son départ, la patiente est systématiquement réévaluée. Ces informations sont consignées dans le cadre prévu à cet effet de la fiche de liaison RME ([Fiche Liaison RME](#)). L'établissement receveur et le RPO sont avisés du départ de la patiente.



# AIDE A LA DÉCISION DE LA CLASSE DE VECTEURS POUR LES TRANSFERTS PÉRINATAUX

## ► I - Définitions

Le choix du type de transport repose sur :

- L'indication du transfert.
- L'état clinique et la stabilité de la patiente.
- Le risque de dégradation maternelle pendant le transport.
- La distance à parcourir.
- L'évaluation du risque d'accouchement pendant le transport.
- La disponibilité des véhicules et équipages, de l'heure et de la météo.

### Classe de vecteur

- **Classe 1** : Transport non médicalisé (type VSL)
- **Classe 2** : Transport paramédical : présence d'un infirmier. Il n'existe pas dans tous les SMUR départementaux. Dans ce cas : opter pour la classe 3.
- **Classe 3** : Transport médicalisé, réalisé par le SMUR. Présence d'un médecin. Il peut être terrestre ou hélicoptéré.

### Pathologies fœtales (in utéro) exclusives

Tout transfert d'indication fœtale exclusive s'effectuera en vecteur de Classe 1 quelle que soit la durée du transport. Attention, toute anomalie du rythme cardiaque fœtal nécessitant une extraction en urgence contre-indique le transfert.

Le RPO ne peut commander les ambulances privées pour les établissements. En cas de délais majeurs impactant le pronostic de la patiente, le RPO peut appuyer la demande de transfert auprès du SAMU départemental. Le RPO vous guide sur le choix du vecteur adapté avec les algorithmes suivant établis en partenariat avec les SAMU.

**Ce travail est un guide et non un document opposable car :**

- **Le choix du mode de transport de la patiente est de la responsabilité du médecin demandeur du transfert.**

**MAIS**

- **La décision finale du mode de transport médicalisé revient au médecin régulateur du SAMU.**

Sources :

[https://www.has-sante.fr/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=c\\_1355792](https://www.has-sante.fr/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=c_1355792)




► II - Risque d'accouchement prématuré à membranes intactes (sans métrorragies)

| Pathologie                               | Activité contractile                                                                     | Modifications cervicale               | Durée de transport | Classe du vecteur                             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Modifications cervicales asymptomatiques | Aucune tocolyse                                                                          | Quelle que soit la longueur cervicale | Indifférent        | Classe 1                                      |
| CU sans modifications cervicales         | Nécessité d'une 2 <sup>e</sup> ligne de tocolyse                                         | Aucune                                | Indifférent        | Classe 1                                      |
| MAP                                      | Stabilisée par 1 <sup>e</sup> ou 2 <sup>e</sup> ligne de tocolyse                        | Quelle que soit la longueur cervicale | Indifférent        | Classe 1                                      |
|                                          | Non stabilisée par 2 <sup>e</sup> ligne de tocolyse :<br>Réévaluation clinique : TV à 1h | TV inchangé à 1h                      | ≤30 min            | Classe 1                                      |
|                                          |                                                                                          |                                       | >30 min            | Classe 3                                      |
|                                          |                                                                                          | Modifications lentes                  | ≤30 min            | Classe 1<br>Après conférence téléphonique à 3 |
|                                          |                                                                                          |                                       | >30 min            | Classe 3                                      |
|                                          |                                                                                          | Modifications rapides                 |                    | Contre-indication au transfert                |



### ► III - Rupture prématurée des membranes avant 36 SA




► IV - Métrorragies - Hémorragie du post-partum  
Anomalie de l'insertion placentaire

| Pathologie                          | Evaluation Clinique                                      | Durée de transport | Classe du vecteur              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Anomalie de l'insertion placentaire | Pas de métrorragie, actives ou métró il y a > 12h        | ≤30 min            | Classe 1                       |
|                                     |                                                          | >30 min            | Classe 3                       |
|                                     | Pas de métrorragies actives ou métró depuis il y a ≤ 12h | ≤30 min            | Classe 2                       |
|                                     |                                                          | >30 min            | Classe 3                       |
|                                     | Métrorragies actives                                     | Indifférent        | Contre-indication au transfert |
|                                     |                                                          |                    |                                |
| HPP                                 | Pas de métrorragies actives, stabilité hémodynamique     | Indifférent        | Classe 3                       |
|                                     | Métrorragies actives                                     | Indifférent        | Contre-indication au transfert |



## ► V - Prééclampsie



# PROCÉDURE - ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES LIÉS A L'ACTIVITÉ DES SOINS

---

## ► I - Objet de la procédure

Signaler des dysfonctionnements en santé n'est pas une tâche agréable. Pourtant cet acte permet de rompre certaines chaînes et redonner du sens à des gestes trop routiniers. Cette procédure décrit les modalités de déclaration et de traitement de tout événement indésirable en lien avec l'activité des transferts périnataux sur le territoire Occitanie. La parole sera accueillie avec neutralité et bienveillance et le signalement sera toujours libre et volontaire.

## ► II - Définitions

**Source :** HAS - Événements indésirables associés aux soins (EIAS)

[https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/guide\\_lanalyse\\_des\\_evenements\\_indesirables\\_associes\\_aux\\_soins\\_eias.pdf](https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/guide_lanalyse_des_evenements_indesirables_associes_aux_soins_eias.pdf)

Un événement indésirable associé aux soins (EIAS) est un événement inattendu qui perturbe ou retarde le processus de soin, ou impacte directement le patient dans sa santé. Cet événement est consécutif aux actes de prévention, de diagnostic ou de traitement. Il s'écarte des résultats escomptés ou des attentes du soin et n'est pas lié à l'évolution naturelle de la maladie. Parmi eux on distingue :

- **Les événements porteurs de risques (EPR) :** ce sont des événements qui auraient pu provoquer un préjudice au patient mais qui ont été évités par le soignant ou le patient. Une ou plusieurs barrières de sécurité empêchant une évolution plus grave ont fonctionné. Il peut s'agir, par exemple, d'une erreur de médicament récupérée par une infirmière ou le patient avant son administration, d'une erreur de dossier patient rattrapée par un chirurgien avant une intervention, d'un défaut de transmission d'une information qui retarde la mise en route d'un traitement.

- **Les événements indésirables graves (EIG) :** ces événements inattendus ont provoqué des conséquences graves pour le patient par exemple :

- Le décès de la patiente, du fœtus ou du nouveau-né.
- Des complications morbides graves chez la patiente, le fœtus ou le nouveau-né.
- La réclamation d'un ou plusieurs usagers.
- Toute autre situation ayant compliqué la prise en charge et dont les conséquences auraient pu être graves.

La gestion des risques associés aux soins vise à prévenir l'apparition d'événements indésirables associés aux soins et, en cas de survenance d'un tel événement, à l'identifier, à en analyser les causes, à en atténuer ou à en supprimer les effets dommageables pour le patient et à mettre en œuvre les mesures permettant d'éviter qu'il se reproduise (Art.R. 6111-1 du Décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010).

Cela peut se faire via une Revue de Morbi Mortalité (RMM), à la demande des professionnels concernés. C'est une analyse collective, rétrospective et systémique de cas marqués par la survenue d'un événement indésirable associé aux soins (décès, complication, mais aussi tout événement indésirable qui aurait pu causer un dommage au patient).

Elle a pour objectif la mise en œuvre et le suivi d'actions pour améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients (HAS, Revue de mortalité et de morbidité, Juin 2017) : [https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-02/revue\\_mortalite\\_et\\_de\\_morbidite\\_rmm\\_fiche\\_technique\\_2013\\_01\\_31.pdf](https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-02/revue_mortalite_et_de_morbidite_rmm_fiche_technique_2013_01_31.pdf)



**Tableau 1 : Les différents niveaux de gravité d'un événement indésirable associé aux soins (EIAS)**

|                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | <b>Niveau 1<br/>«Mineur»</b>         | L'EIAS provoque un désagrément ou une insatisfaction au patient.                                                                          |
|                                                                                                                                                                              | <b>Niveau 2</b>                      | L'EIAS impacte le patient sans mise en jeu de sa sécurité et sans interrompre sa prise en charge initiale.                                |
|                                                                                                                                                                              | <b>Niveau 3<br/>«Majeur»</b>         | Une prise en charge spécifique ou une surveillance accrue sont nécessaires sans pour autant interrompre la prise en charge.               |
| <b>À partir du niveau 4</b> : la prise en charge de l'EIAS prend le dessus sur la prise en charge de la pathologie initiale. La prise en charge initiale doit être reportée. |                                      |                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                              | <b>Niveau 4<br/>«Critique»</b>       | L'EIAS est récupéré au final avec des conséquences réversibles.                                                                           |
|                                                                                                                                                                              | <b>Niveau 5<br/>«Catastrophique»</b> | L'EIAS est difficilement récupérable.<br>On pourra au mieux atténuer ses conséquences qui restent cependant importantes et irréversibles. |

### ► III - Procédure de déclaration

- La déclaration doit avoir lieu le plus tôt possible après l'événement.
- Je déclare en ligne [https://www.perinatalite-occitanie.fr/form/index.php/795865?lang=fr\\_](https://www.perinatalite-occitanie.fr/form/index.php/795865?lang=fr_); en mentionnant le plus d'informations permettant de me recontacter (téléphone, mail, courrier). Un rappel téléphonique sera réalisé par l'équipe du RPO pour prendre en compte ma déclaration et la traiter dans les meilleurs délais.
- Un message peut aussi être laissé sur le répondeur téléphonique **09 70 75 30 50**

### ► IV - Procédure de traitement des EIAS

Le RPO s'engage avec les professionnels et établissements dans une analyse des EIAS et des dysfonctionnements survenus dans le parcours patient qui lui sont signalés.

#### A - EI graves

L'analyse d'un EI grave se fait via une RMM en présentiel avec tous les acteurs impliqués.

**L'objectif n'est pas un recueil statistique mais une approche personnalisée de gestion des risques par :**

- Le soutien aux établissements qui le demandent : RMM, expertises, formations, partage de retours d'expériences
- L'accompagnement des équipes à la mise en place d'actions d'amélioration
- La création d'outils régionaux

Pour animer la RMM, le RPO recherchera des experts extérieurs à l'établissement, qui auront la charge de s'appuyer sur des référentiels et recommandations. De plus, le RPO veillera au respect de l'anonymisation selon les recommandations HAS.

#### B - EI non graves

L'analyse d'un EI non grave se fait par recueil d'informations auprès des professionnels concernés par l'équipe médicale du RPO via des échanges téléphoniques ou mails.





# FICHES & OUTILS

## FICHE DE LIAISON « TRANSFERT IN UTERO »



**RAPPEL des CONTRE INDICATIONS au TRANSFERT IN UTERO (à discuter en équipe)**

- ✓ HRP ou suspicion d'HRP
- ✓ Travail avancé (plus de 4cm de dilatation) et / ou risque majeur d'accouchement pendant le transport
- ✓ Anomalies du RCF en faveur d'une souffrance fœtale aiguë incompatible avec un TIU
- ✓ Etat maternel incompatible avec un TIU (syndrome hémorragique, éclampsie, choc septique)

### INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Etablissement d'origine



Coordonnées du service demandeur

Médecin "Demandeur" (qui demande le transfert) : Dr

Médecin "réfèrent" (qui suit normalement la grossesse) : Dr

(Précisez si suivi hors établissement) :

Médecin traitant : Dr

Sage-femme ayant réalisé le transfert

Date de l'appel : / / Heure :  
Date d'acceptation : / / Heure :  
Date du départ : / / Heure :

Etablissement receveur

Médecin ayant accepté le transfert : Dr

Moyen de transport : ☐ Classe 1 (non médicalisé)  
☐ Classe 2 (paramédicalisé)  
☐ Classe 3 terrestre  
☐ Classe 3 hélicoptère

Identité du transporteur :

### IDENTIFICATION DE LA PATIENTE

NOM, prénom, NIF :

DDN :

Nom et coordonnées de la personne à prévenir :

Adresse :

Ou  
Étiquette

Réseau de Périnatalité Occitanie - SIREN : 841 258 650 - N° d'organisme de formation : 76310931931 - N° DPC : 9062 - Site Toulouse Maison des réseaux - 24 impasse de la Flamèche - 31300 Toulouse Site Montpellier Espace Henri Berthoin Sans Sûr A - 59 avenue de Fés 34090 Montpellier - www.perinatalite-occitanie.fr

## Fiche de liaison transfert in utero

Format : PDF - 4 pages

[Télécharger le document en cliquant ici](#)

## FICHE DE LIAISON « TRANSFERT POST PARTUM POUR PATHOLOGIE MATERNELLE »

Etablissement envoyeur

Service :  
Téléphone :  
Médecin GO :  
Médecin anesthésiste :  
Sage-femme :

Etablissement receveur

Service :  
Téléphone :  
Médecin GO :  
Médecin anesthésiste :

Identification / Étiquette de la mère

Nom :  
Prénom :  
Nom de naissance :  
Née le :

Identification de l'enfant

Nom :  
Prénom :  
Sexe :  
Né(e) le :  
Nom du père :

### INDICATION DU TRANSFERT

Transfert contre indiqué en cas de : saignement actif et / ou instabilité hémodynamique

### GROSSESSE

Antécédents notables de la mère :

Gestité/Parité :

Allergies :

Addictions :

Groupe Rhésus :

Si Rhésus négatif, dose et date du dernier Rhophylac :

Patiente connue EFS :

☐ 2 déterminations EFS

☐ 1 détermination EFS

☐ Non connue EFS

RAI < 72h

☐ Oui (date, heure) :

☐ Non

Sérologies maternelles : Toxo :

Rubéole :

HIV :

BW :

VHB :

VHC :

Précisions

Déroulement de la grossesse :

Réseau de Périnatalité Occitanie - SIREN : 841 258 650 - N° d'organisme de formation : 76310931931 - N° DPC : 9062 - Site Toulouse Maison des réseaux - 24 impasse de la Flamèche - 31300 Toulouse Site Montpellier Espace Henri Berthoin Sans Sûr A - 59 avenue de Fés 34090 Montpellier - www.perinatalite-occitanie.fr

## Fiche de liaison transfert post partum pour pathologie maternelle

Format : PDF - 4 pages

[Télécharger le document en cliquant ici](#)



## FICHE DE LIAISON « RAPPROCHEMENT MÈRE-ENFANT »

|                                                                                                                             |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etablissement envoyeur</b><br>Service :<br>Téléphone :<br>Médecin :<br>Sage-femme :                                      | <b>Etablissement receveur</b><br>Service :<br>Téléphone :<br>Médecin :<br>Sage-femme :          |
| <b>Identification/Étiquette de la mère</b><br>Nom :<br>Prénom :<br>Nom de naissance :<br>Née le :<br>Code Postal et ville : | <b>Identification de l'enfant</b><br>Nom :<br>Prénom :<br>Sexe :<br>Né(e) le :<br>Nom du père : |



Les patientes doivent se présenter dans le service qui les accueille avant de se rendre en pédiatrie.

### GROSSESSE

Antécédents notables de la mère :

.....

.....

.....

Allergies :

Addictions :

Groupe Rhésus : Si Rh négatif : groupe bébé : Dernier Rhophylac et dose :

Sérologies maternelles : Toxo : Rubéole : HIV : BW : VHB : VHC :

Précisions :

Déroulement de la grossesse (ex : diabète gesta...) :

.....

.....

.....

## Fiche de liaison « Rapprochement Mère-Enfant »

Format : PDF - 3 pages

[Télécharger le document en cliquant ici](#)



## FICHE DE CONSENTEMENT TRANSFERT

Réseau de Périnatalité Occitanie

Madame,

**Vous allez être transférée vers une autre maternité adaptée à votre prise en charge et à celle de votre nouveau-né.** Vous allez ainsi bénéficier de l'organisation des maternités de la région au sein du Réseau Périnatal d'Occitanie (RPO).

### L'ÉQUIPE TRANSFERT VA

- » Trouver une place adaptée à vos besoins et coordonner le transfert.
- » Optimiser votre prise en charge et la bonne collaboration entre les équipes médicales.
- » Communiquer des éléments de votre dossier médical aux diverses équipes vous prenant en charge.

Je soussigné, Mme .....

### ACCEPTE D'UNE PART

Le transfert qui m'a été proposé par le Dr .....

Exerçant dans la maternité .....

Pour être prise en charge dans la maternité .....

### ET D'AUTRE PART

Que les éléments médicaux recueillis lors du transfert soient communiqués aux équipes receveuses selon la charte patient (cf. p.2)

Je reconnais avoir reçu « La charte du patient » (p.2), et j'en accepte les termes.

Fait à ..... Le ..... / ..... / .....

Signature

Vos commentaires .....

.....

.....

Ce document médico-légal est de la responsabilité de l'établissement demandeur et doit être archivé dans le dossier patient.

## Fiche de consentement transfert

Format : PDF - 2 pages

[Télécharger le document en cliquant ici](#)



## FICHE SIMPLIFIÉE DE RECUEIL D'INFORMATIONS

### I. Généralités

Nom du médecin demandeur : ..... Tél. : .....  
 Maternité demandeur : ..... Type : .....  
 Date et heure de l'appel : .....  
 Motif de l'appel : .....  
 La patiente est-elle transférable ? ☐ Oui ☐ Non Délai de transfert souhaité : .....  
 Le transfert est-il différé jusqu'à la reprise par le RPO ☐ Oui ☐ Non  
 Identité de la patiente (Nom – Prénom – DDN) : .....

### II. Informations cliniques :

Terme : ..... Gestité / Parité : .....  
 Contexte clinique : .....  
 Traitements : .....  
 Echo/Doppler/EPF : .....  
 Résultats biologiques : .....

### III. Orientation

|               |                                                                                |                                                                                                                           |                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Maternité 1   | Nom Pédiatre <input type="checkbox"/> Accord<br><input type="checkbox"/> Refus | Appel SAMU<br><input type="checkbox"/> Classe 1<br><input type="checkbox"/> Classe 2<br><input type="checkbox"/> Classe 3 | Heure d'acceptation |
| Heure d'appel | Nom GO <input type="checkbox"/> Accord<br><input type="checkbox"/> Refus       |                                                                                                                           | Heure de départ     |
| Maternité 2   | Nom Pédiatre <input type="checkbox"/> Accord<br><input type="checkbox"/> Refus | Appel SAMU<br><input type="checkbox"/> Classe 1<br><input type="checkbox"/> Classe 2<br><input type="checkbox"/> Classe 3 | Heure d'acceptation |
| Heure d'appel | Nom GO <input type="checkbox"/> Accord<br><input type="checkbox"/> Refus       |                                                                                                                           | Heure de départ     |
| Maternité 3   | Nom Pédiatre <input type="checkbox"/> Accord<br><input type="checkbox"/> Refus | Appel SAMU<br><input type="checkbox"/> Classe 1<br><input type="checkbox"/> Classe 2<br><input type="checkbox"/> Classe 3 | Heure d'acceptation |
| Heure d'appel | Nom GO <input type="checkbox"/> Accord<br><input type="checkbox"/> Refus       |                                                                                                                           | Heure de départ     |

Réseau de Périnatalité Occitanie – SIREN : 841 258 650 – N° d'organisme de formation : 76310931931 – N° DPC : 9062 – Site Toulouse Maison des réseaux - 24 Impasse de la Flambrère – 31300 Toulouse Site Montpellier Espace Henri Bertin Sans Bât A – 59 avenue de Fés 34080 Montpellier – www.perinatalite-occitanie.fr

## Fiche simplifiée de recueil d'informations

Format : PDF - 1 page

[Télécharger le document en cliquant ici](#)

## CHECK LIST TRANSFERT

(Aide au process, permet de vérifier que rien n'est oublié avant le départ de la patiente)

### I. Demande de transfert in utero

Confirmation lieu d'accueil .....  
 Heure d'arrivée prévue ( ... h....).....

### II. Information patiente

Fiche de consentement et d'information transfert signé (11 consentement) .....  
 Formulaire personne de confiance .....

### III. Dossier patiente

Pièce d'identité .....  
 Fiche de liaison (ou courrier médical) .....  
 Suivi clinique de la grossesse +/- accouchement .....  
 Carte de groupe sanguin .....  
 Sérologies obligatoires (BW, Toxo, Rub, HIV, VHB, VHC) .....  
 Résultats bilans sanguins .....  
 Échographies (toutes les échographies de la grossesse) .....  
 Copie du dernier ERF .....  
 Feuille de prescription / administration médicamenteuse .....  
 Consultation anesthésie si réalisée .....  
 Fiche de surveillance HPP le cas échéant .....

### IV. Transport : classe de vecteur de transport validée avec le SAMU

☐ Classe 1 (non médicalisé) ☐ Classe 2 (paramédicalisé)  
☐ Classe 3 terrestre ☐ Classe 3 hélicoptère

### V. Avant départ

Conditionnement patiente selon aide-mémoire (14 conditionnement) .....  
 Médication en quantité suffisante pour le transfert .....  
 Réévaluation patiente au moment du départ + information au receveur .....  
 Recensement transfert (appel ou email au RPO) .....

Réseau de Périnatalité Occitanie – SIREN : 841 258 650 – N° d'organisme de formation : 76310931931 – N° DPC : 9062 – Site Toulouse Maison des réseaux - 24 Impasse de la Flambrère – 31300 Toulouse Site Montpellier Espace Henri Bertin Sans Bât A – 59 avenue de Fés 34080 Montpellier – www.perinatalite-occitanie.fr

## Check list transfert

Format : PDF - 1 page

[Télécharger le document en cliquant ici](#)



|                                    |                                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| Version n°2                        | Création le 16/12/2019<br>Modification le 27/11/22 | Validation le<br>Par |
| Nom : Aide-Mémoire Conditionnement |                                                    |                      |

#### Aide-mémoire pour le conditionnement des patientes avant TIU

##### MAP / RPM

- Fibronectine dans la mesure du possible
- Echo col (< 34SA) + contrôle après 30-60' de tocolyse + TV
- Corticothérapie IM (si<34SA) après avis centre référent
- Bilan infectieux (NFS/CRP/PV/ECBU)
- Echo foetale avec EPF récente (<15j) et présentation
- ERCF de 30 min (>26SA)
- Tocolyse
- Antibiothérapie si RPM
- si col <10mm / BI+ ou tachyc ou hyperthermie maternelle, faire Promtest.

##### Pathologies vasculaires (HTA - Pré éclampsie)

- Corticothérapie IM (si<34SA) après avis centre référent
- Pose VVP
- Bilan biologique HTA
- ERCF de 30 min minimum
- Echo foetale + EPF
- +/- traitement hypotenseur IV et sulfate Mg++ (selon gravité)
- Monitoring maternel pendant transport

##### Métrorragies

- Constantes maternelles (TA, FC)
- Corticothérapie IM (si<34SA) après avis centre référent
- Pose VVP
- Bilan sanguin: groupe sanguin, bilan pré-op, Kleihauer
- ERCF
- Echo obstétricale abdominale et endovaginale (localisation placentaire, vaisseaux praevia?)
- Echo foetale (EPF, dopplers dont ACM)
- Tocolyse

##### RCIU

- Corticothérapie IM (si<34SA) après avis centre référent
- ERCF avec VCT si possible
- Tocolyse si ANCF
- Echo foetale: EPF en percentile, préciser l'utilisation des courbes individualisées, transmettre toutes les echos
- Dopplers foetaux (dont diastole ombilicale)
- Position en DLG à privilégier pendant transport

SIREN : 841 258 650 - N° d'organisme de formation : 76310931931 - N° DPC : 9062 - [www.perinatalite-occitanie.fr](http://www.perinatalite-occitanie.fr)

Site Toulouse  
Maison des réseaux  
24 impasse de la Flamèche  
31300 TOULOUSE

Site Montpellier  
Espace Henri Bertin Sams  
Bat A - 59 avenue de Fies  
34080 MONTPELLIER

#### Aide-mémoire pour le conditionnement des patientes avant TIU

Format : PDF - 1 page

[Télécharger le document en cliquant ici](#)

# MÉMO

Annuaire des maternités en Occitanie  
et hors-région Occitanie pour l'aide aux  
transferts périnataux

Pour tout transfert maternel appelez  
le numéro unique : 09 70 75 30 50

#### Mémo - annuaire des maternités en Occitanie et hors-région Occitanie pour l'aide aux transferts

Format : PDF - 8 pages

[Télécharger le document en cliquant ici](#)



# Enquête de satisfaction des patientes

TRANSFERTS IN UTERO DU 25/09/23 AU 15/10/23

PÔLE TRANSFERTS DU RÉSEAU DE PÉRINATALITÉ OCCITANIE  
www.perinatalite-occitanie.fr



Enquête de satisfaction des patientes  
Format : PDF - 13 pages  
[Télécharger le document en cliquant ici](#)

## LETTRE D'INFORMATION A DESTINATION DES PATIENTES LORS DES PERIODES DE SURACTIVITE

La maternité où vous vous trouvez actuellement rencontre une période de suractivité ne permettant pas une prise en charge dans des conditions de sécurité optimales pour vous-même ou votre nouveau-né.


Un transfert peut alors vous être proposé dans ces conditions, dans un établissement adapté à votre prise en charge et à votre situation.

Ce transfert peut être réalisé le jour de votre accouchement ou dans les suites immédiates de votre accouchement.

Une équipe dédiée de sage-femmes du Réseau de Périnatalité Occitanie (RPO) coordonne sur la région Occitanie l'ensemble de ces demandes.

Lorsque la sage-femme du RPO est sollicitée par la maternité où vous vous trouvez, elle contacte alors les maternités voisines susceptibles de vous accueillir et de vous prendre en charge, en privilégiant tant que possible la proximité, tout en prenant en compte votre choix.

A titre indicatif, vous trouverez ci-dessous la carte des maternités de la région Occitanie, ainsi que les maternités hors-région les plus proches vers lesquelles vous pourriez être transférée :



Réseau de Périnatalité Occitanie - SIREN : 841 258 620 00032 - N° d'organisme de formation : 75310931931 N° DPC : 9062  
Site Toulouse (Siège social) - Maison des réseaux - 24 impasse de la Flamèche - 31300 Toulouse  
Site Montpellier - Espace Henri Berthelot Sans Bât A - 59 avenue de Fès - 34080 Montpellier

Lettre d'information à destination des  
patientes lors des périodes de suractivité  
Format : PDF - 1 page  
[Télécharger le document en cliquant ici](#)







# **PROTOCOLES & PROCÉDURES**

|                                            |                      |                           |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Version n°1                                | Création le 08/02/22 | Validation le 11/3/22     |
| Nom : Procédure interne transfert complexe | Diffusion :          | Par pole GDR et transfert |

## PROCEDURE TRANSFERT COMPLEXE PAR MANQUE DE PLACE

Procédure ayant pour objectif de guider les permanents du RPO et les équipes d'orientation la nuit, dans le traitement d'une demande de TIU se révélant complexe.

### Définition de la complexité :

- Manque de place d'accueil de la patiente / de l'enfant à naître dans la structure adaptée la plus proche géographiquement

### Et/ou

- Terme de la grossesse entre 24 et 26 SA et proximité avec le CH de Perpignan (niveau 3 mais prise en charge des prématurés à partir de 26 SA)

### Et

- Impactant la sécurité et la réalisation du transfert en allongeant le temps d'orientation et de régulation.

### Cette procédure doit permettre de :

- Faciliter le travail d'orientation : procédure claire pour représenter le dossier si le transfert devient « acrobatique »
- Eviter les accouchements pendant les transferts
- Eviter les naissances outborn

### I. Recueil d'une demande de TIU relevant d'un type 3 (pathologie ou terme)

Dans un contexte déjà connu de tension des lits pédiatriques +/- mater

#### 1. Médecin GO du RPO présent :

Présentation du dossier et élaboration de la stratégie de régulation.

#### 2. Sinon, commencer par le type 3 le plus proche :

Conversation entre le médecin demandeur + obstétricien senior du type 3 + information du pédiatre senior du type 3. Guider la conversation pour qu'à la fin de la conférence, on puisse répondre de manière claire aux items suivants :

- ✓ Indication de TIU pertinente.
- ✓ Pas de contre-indication au TIU.
- ✓ Le transfert ne peut être différé.
- ✓ Limite de terme de prise en charge du nouveau-né prématuré établie.

### II. Si refus de transfert vers la structure de type 3 la plus proche pour manque de place

Il est pertinent de chercher au plus proche de la patiente en considérant les difficultés de vecteurs SAMU :

- Tenter des concertations dans les autres types 3 de la région Occitanie en partant du plus proche au plus loin

### Ou

- Tenter une demande hors région d'embellie pour les maternités limitrophes ou si pas de place en région

Réseau de Périnatalité Occitanie – SIREN : 841 258 050 – N° d'organisme de formation : 76310031931 – N° DPC : 9062 – Site Toulouse Maison des réseaux – 24 Impasse de la Flamèche – 31300 Toulouse Site Montpellier Espace Henri Berlioz Sans Bât A – 59 avenue de Fés 34080 Montpellier [www.perinatalite-occitanie.fr](http://www.perinatalite-occitanie.fr)

## Procédure transfert complexe par manque de place

Format : PDF - 2 pages

[Télécharger le document en cliquant ici](#)

## Transferts pour hémorragies du post partum

| Historique des modifications |                       |                            |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Version                      | Dates de modification | Objets de la modification  |
| N°1                          | 20/07/2016            | Création                   |
| N°2                          | 05/04/2022            | Charte graphique / Contenu |

Indexation : 2022\_Ref Transferts\_HPP, référentiel accessible sur [www.perinatalite-occitanie.fr](http://www.perinatalite-occitanie.fr)

Seule la version informatique fait foi.

Périodicité de révision : 5 ans

- ✓ **Rédaction** : Dr Allouche Mickael et Dr Hastoy Anita, Gynécologue Obstétriciens, CHU Toulouse
- ✓ **Relecture** : Dr Bertrand, Gynécologue Obstétricienne, RPO – CHU Toulouse
- ✓ **Validation** : Conseil scientifique RPO du 05/04/2022

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objet                  | Le protocole décrit la prise en charge des patientes lors d'un transfert du post partum pour hémorragie de la délivrance. Il définit également les modalités d'orientation des patientes très à risque d'HPP.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Domaine d'application  | Ce référentiel s'adresse aux équipes des maternités et des urgentistes. Rédigé sous l'égide du Réseau de Périnatalité Occitanie, ce référentiel est proposé à titre indicatif, et ne saurait être opposable au cas où le praticien en charge du patient estimerait qu'une conduite différente serait plus appropriée, dans le cas général ou dans un cas particulier.                                                                                                                      |
| Documents de référence | <ul style="list-style-type: none"> <li>Recommandations HAS 2012 : « Femmes enceintes ayant une complication au cours de leur grossesse : transferts en urgence entre les établissements de santé »</li> <li>Recommandations pour la pratique clinique du CNGOF 2014 : « Les hémorragies du post-partum »</li> <li>Revert Intrauterine balloon tamponade for management of severe postpartum haemorrhage in a perinatal network: a prospective cohort study 25 October 2016 BJOG</li> </ul> |
| Abréviations utiles    | <ul style="list-style-type: none"> <li>AG : anesthésie générale</li> <li>GO : gynécologue obstétricien</li> <li>Hb : hémoglobine</li> <li>HPP : hémorragie du post partum</li> <li>IADE / IDE : infirmier (anesthésiste) diplômé d'état /</li> <li>IVL : intra veineuse lente</li> <li>PSL : produit sanguins labiles</li> <li>SAMU : service d'aide médicale d'urgence</li> <li>SMUR : service mobile d'urgence réanimation</li> <li>TA : tension artérielle</li> </ul>                   |

## Référentiel - Transferts pour hémorragies du post partum

Format : PDF - 6 pages

[Télécharger le document en cliquant ici](#)

## Référentiel pour l'orientation des patientes confirmées d'infection COVID-19 en maternité dans l'Occitanie

| Historique des modifications |                       |                           |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Version                      | Dates de modification | Objets de la modification |
| N°1                          | 06/04/2020            | Création                  |
| N°2                          | 05/04/2022            | Mise à jour               |

Indexation : 2020\_Ref\_Transferts\_COVID, référentiel accessible sur [www.perinatalite-occitanie.fr](http://www.perinatalite-occitanie.fr)  
Seule la version informatique fait foi.  
Périodicité de révision : 5 ans

### ✓ Rédaction :

- Dr ALLOUCHE Mickaël, PH GO CHU de Toulouse
- Pr BOULOT Pierre, PU-PH CHU Montpellier
- Dr CLAINQUART Nathalie, PH CH Perpignan
- Pr DE TAYRAC Renaud, PU-PH CHU Nîmes
- Pr FUCHS Florent, PU-PH CHU Montpellier
- Dr HASTOY Anita, PH GO CHU de Toulouse
- Dr HUBERLANT-BALAS Stéphanie, PH GO CHU Nîmes
- Pr LETOUZEY Vincent, PU-PH CHU Nîmes
- Pr PARANT Olivier, PU-PH CHU de Toulouse
- Pr VAYSSIERE Christophe, PU-PH CHU de Toulouse

### ✓ Relecture :

- Mme ARVOIS Christine, SF Coordinatrice médicale RPO
- Dr BERTRAND Armelle, Gynécologue Obstétricienne, RPO – CHU Toulouse
- Dr BURLLET Gilles, PH CHU Montpellier
- Dr BRAZET Edith, CHU Toulouse
- Mr CLERVOY Romain, SF Coordinateur médical RPO
- Dr CONNAN Laure, CHU Toulouse
- Mme DUCHANOIS Delphine, SF RPO
- Mme FERRAND Nathalie, SF Coordinatrice CH Perpignan
- Mme FOISSIN Dominique, SF Coordinatrice médicale RPO
- Dr GUYARD-BOILEAU Béatrice, CHU Toulouse
- Dr MOUSTY Eve, PH GO CHU Nîmes
- Dr ROUCOLLE Pierre, SAMU, CHU Toulouse
- Dr TANGUY LE GAC Yann, CHU Toulouse
- Dr THIERRY Fabien, Pédiatre SMUR pédiatrique, CHU Toulouse
- Dr THEVENOT Jean, GO et Président du RPO, Toulouse

✓ Validation : Conseil scientifique RPO du 05/04/2022

## Référentiel pour l'orientation des patientes confirmées d'infection COVID-19 en maternité dans l'Occitanie

Format : PDF - 5 pages

[Télécharger le document en cliquant ici](#)

## Métrorragies et transferts pendant la grossesse (Placenta Prævia, Accrêta, Vasa Prævia)

| Historique des modifications |                       |                           |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Version                      | Dates de modification | Objets de la modification |
| N°1                          | 02/11/2022            | Création                  |

Indexation : 2022\_ref\_MTR\_transferts.docx, référentiel accessible sur [www.perinatalite-occitanie.fr](http://www.perinatalite-occitanie.fr)  
Seule la version informatique fait foi.  
Périodicité de révision : 5 ans

✓ Rédaction : Dr Allouche, Obstétricien, CHU Toulouse.

✓ Relecture : Dr Bertrand, RPO ; Dr Marie Portes, RPO.

✓ Validation : Conseil scientifique RPO du 18/10/2022

| Objet                  | Le protocole décrit la prise en charge des patientes lors d'un transfert in-utero pour métrorragies pendant le deuxième et troisième trimestre de la grossesse : Placenta Prævia, Vasa Prævia et Placenta Accrêta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domaine d'application  | Ce référentiel s'adresse aux équipes des maternités. Rédigé sous l'égide du Réseau de Périnatalité Occitanie, ce référentiel est proposé à titre indicatif, et ne saurait être opposable au cas où le praticien en charge du patient estimerait qu'une conduite différente serait plus appropriée, dans le cas général ou dans un cas particulier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Documents de référence | Recommandations HAS 2012 : « Femmes enceintes ayant une complication au cours de leur grossesse : transferts entre les établissements de santé »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Abréviations utiles    | ACOG : American college of obstetricians and gynecologists<br>ACM : artère cérébrale moyenne<br>AR : anesthésiste réanimateur<br>CAT : conduite à tenir<br>CI : contre-indication<br>CP : comprimés<br>ERCF : enregistrement du rythme cardiaque fœtal<br>GO : gynécologue-obstétricien<br>HPP : hémorragie du post-partum<br>HRP : hématome rétro placentaire<br>IM : intra musculaire<br>IRM : imagerie par résonance magnétique<br>LP : libération prolongée<br>NFS : numération formule sanguine<br>OI : orifice interne<br>PSL : produits sanguins labiles<br>RAI : recherche agglutinines irrégulières<br>SA : semaines d'aménorrhées<br>SAMU : service d'aide médicale urgente<br>SMUR : structure mobile d'urgence réanimation<br>TAS : tension artérielle systolique<br>TCA : temps de coagulation activée<br>TIU : transfert in utero<br>TP : taux de prothrombine<br>TV : toucher vaginal<br>UI : unités internationales |

## Référentiel métrorragies et transferts pendant la grossesse

Format : PDF - 9 pages

[Télécharger le document en cliquant ici](#)

## Rupture prématurée des membranes et transfert

| Historique des modifications |                       |                           |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Version                      | Dates de modification | Objets de la modification |
| N°1                          | 17/03/2023            | Création                  |

Indexation : 2023\_Ref\_RPM\_Transfert, référentiel accessible sur [www.perinatalite-occitanie.fr](http://www.perinatalite-occitanie.fr)  
Seule la version informatique fait foi.  
Périodicité de révision : 5 ans

- ✓ **Rédaction** : Dr Harmonie DUPUIS -Gynécologue-obstétricienne- RPO, CHU Toulouse  
Dr Romy RAYSSIGUIER – Gynécologue-obstétricienne -CHU Arnaud de Villeneuve, Montpellier  
Mme Coralie FREGONESE – Sage-femme enseignante – Hôpital Paule de Viguier, Toulouse  
Mme Emilie HERVE-ANDRE – Sage-femme enseignante – CHU Arnaud de Villeneuve, Montpellier  
Dr Louise PARET, Gynécologue-obstétricienne – Hôpital Paule de Viguier, Toulouse  
Dr Géraldine GASCOIN – Pédiatre – Hôpital des Enfants, Toulouse

- ✓ **Relecture** : Membres du Conseil scientifique du RPO
- ✓ **Validation** : Conseil scientifique RPO du 18/04/2023
- ✓ **Diffusion** :

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objet</b>                  | Le protocole décrit la prise en charge des patientes lors d'un transfert in-utero pour rupture prématurée des membranes.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Domaine d'application</b>  | Ce référentiel s'adresse aux équipes des maternités. Rédigé sous l'égide du Réseau de Périnatalité Occitanie, ce référentiel est proposé à titre indicatif, et ne saurait être opposable au cas où le praticien en charge du patient estimerait qu'une conduite différente serait plus appropriée, dans le cas général ou dans un cas particulier. |
| <b>Documents de référence</b> | Recommandations CNGOF 2018 _ Rupture prématurée des membranes avant terme                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Abréviations</b>           | CAN : corticothérapie anténatale<br>LA : liquide amniotique<br>RPM : rupture prématurée des membranes<br>RCIU : retard de croissance intra utérin<br>TV : touché vaginal                                                                                                                                                                           |

## Référentiel rupture prématurée des membranes et transfert

Format : PDF - 5 pages

[Télécharger le document en cliquant ici](#)

## Transfert pour pathologie vasculaire placentaire

| Historique des modifications |                       |                            |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Version                      | Dates de modification | Objets de la modification  |
| N°1                          | 11/07/2016            | Création                   |
| N°2                          | 04/01/2023            | Charte graphique / Contenu |

Indexation : 2023\_Ref\_Transfert\_PathoVasculaire, référentiel accessible sur [www.perinatalite-occitanie.fr](http://www.perinatalite-occitanie.fr)  
Seule la version informatique fait foi.  
Périodicité de révision : 5 ans

- ✓ **Rédaction** : Cellule réseau, Groupe de travail régional
- ✓ **Relecture** : Marie PORTES, Gynécologue Obstétricienne, RPO – CHU Nîmes
- ✓ **Validation** : Conseil scientifique RPO du 17/01/2023
- ✓ **Diffusion du référentiel** : 17/01/2023

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objet</b>                  | Le protocole décrit la prise en charge des patientes lors d'un transfert in utero pour pathologie vasculaire placentaire : pré-éclampsie et ses complications.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Domaine d'application</b>  | Ce référentiel s'adresse aux équipes des maternités et des urgentistes. Rédigé sous l'égide du Réseau de Périnatalité Occitanie, ce référentiel est proposé à titre indicatif, et ne saurait être opposable au cas où le praticien en charge du patient estimerait qu'une conduite différente serait plus appropriée, dans le cas général ou dans un cas particulier. |
| <b>Documents de référence</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Recommandations HAS 2012 : « Femmes enceintes ayant une complication au cours de leur grossesse : transferts en urgence entre les établissements de santé »</li> </ul>                                                                                                                                                         |

## Référentiel transfert pour pathologie vasculaire placentaire

Format : PDF - 10 pages

[Télécharger le document en cliquant ici](#)

## Transfert In Utero et Menace d'Accouchement Prématuré

| Historique des modifications |                       |                           |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Version                      | Dates de modification | Objets de la modification |
| N°1                          | 24/03/2023            | Création                  |

Indexation : 2023\_TIU\_MAP, référentiel accessible sur [www.perinatalite-occitanie.fr](http://www.perinatalite-occitanie.fr)  
Seule la version informatique fait foi.

Périodicité de révision : 5 ans

- ✓ Rédaction : Dr Armelle BERTRAND, Gynécologue - obstétricienne, RPO Toulouse  
Mme Jessica COQUENAS, Sage-femme coordinatrice médicale, RPO Toulouse  
Dr Harmonie DUPUIS, Gynécologue - obstétricienne et épidémiologiste, RPO Toulouse  
Dr Marie PORTES, Gynécologue - obstétricienne, RPO Montpellier
- ✓ Relecture : Membres du Conseil Scientifique RPO
- ✓ Validation : Conseil scientifique RPO du 17/01/2023

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objet                  | Le protocole décrit la prise en charge des patientes lors d'un transfert in utero pour risque d'entrée en travail prématuré à membranes intactes                                                                                                                                                                                                   |
| Domaine d'application  | Ce référentiel s'adresse aux équipes des maternités. Rédigé sous l'égide du Réseau de Périnatalité Occitanie, ce référentiel est proposé à titre indicatif, et ne saurait être opposable au cas où le praticien en charge du patient estimerait qu'une conduite différente serait plus appropriée, dans le cas général ou dans un cas particulier. |
| Documents de référence | <ul style="list-style-type: none"> <li>Recommandations HAS 2012 « Femmes enceintes ayant eu une complication au cours de leur grossesse : transferts en urgence entre les établissements de santé »</li> <li>Recommandations du CNGOF 2016 « Prévention de la prématurité spontanée et de ses conséquences »</li> </ul>                            |
| Abréviations           | TIU : transfert In Utero<br>MAP : menace d'Accouchement Prématuré<br>HRP : hémotome rétro placentaire<br>RCF : rythme cardiaque fœtal<br>TV : toucher vaginal<br>LA : liquide amniotique<br>ERCF : enregistrement du rythme cardiaque fœtal<br>EPF : estimation de poids fœtal<br>CU : contraction utérine<br>PDE : poche des eaux                 |

## Référentiel transfert In Utero et menace d'accouchement prématuré

Format : PDF - 8 pages

[Télécharger le document en cliquant ici](#)

## LETTRE D'INFORMATION A DESTINATION DES PATIENTES LORS DES DEMANDES DE RME (rapprochements mère-enfant)

Votre enfant a été transféré après sa naissance en service de néonatalogie au sein d'une maternité de type 3 (Montpellier, Nîmes, Perpignan ou Toulouse), ou d'un type 2 (A ou B) de la région Occitanie.

Un transfert pour rapprochement mère-enfant peut être demandé auprès de la cellule transfert du RPO par l'équipe de la maternité dans laquelle vous avez accouché, afin de poursuivre votre hospitalisation de suites de couches dans le même établissement que celui où votre enfant a été transféré.

La durée de cette hospitalisation post partum est indépendante de celle de votre enfant, et sera définie selon votre situation clinique en regard des durées moyennes de séjours standards en maternité recommandées par l'HAS :

- 72 heures après un accouchement par voie basse, pouvant aller jusqu'à 96 heures en fonction de votre état clinique,
- 96 heures après un accouchement par césarienne, pouvant aller jusqu'à 120 heures en fonction de votre état clinique.
- Si votre état clinique le permet, une sortie précoce est parfois proposée, indépendante de l'hospitalisation de votre enfant.

Lorsque la sage-femme transfert du RPO est sollicitée par votre maternité d'accouchement, elle contacte la maternité où a été transféré votre enfant pour s'informer de la disponibilité d'un lit dans le secteur des suites de couches et organiser la continuité de votre prise en charge.

Plusieurs cas de figure sont possibles :

- ✓ Si une place est disponible, la sage-femme transfert en informe votre maternité et le transport est organisé dans la journée.
- ✓ Si une place n'est pas disponible le jour-même, la demande peut être renouvelée le lendemain. Une permission de sortie pour aller voir votre enfant est envisageable sur accord de l'équipe médicale, selon votre situation clinique et respectant des consignes précises.
- ✓ Si votre transfert n'a pas été possible jusqu'au jour de votre sortie d'hospitalisation par manque de place, des solutions d'hébergements en dehors du secteur d'hospitalisation de maternité existent (cf annexes).

## Lettre d'information à destination des patientes lors des demandes de rappro- chements mère-enfant

Format : PDF - 2 pages

[Télécharger le document en cliquant ici](#)



## LETTRÉ D'INFORMATION A DESTINATION DES PATIENTES LORS DES DEMANDES DE RME (rapprochements mère-enfant)

Votre enfant a été transféré après sa naissance en service de néonatalogie ou réanimation au sein d'une maternité de type 3 au CHU de Montpellier.

Un transfert pour **rapprochement mère-enfant peut être demandé auprès de la cellule transfert du RPO** par l'équipe de la maternité dans laquelle vous avez accouché, afin de poursuivre votre hospitalisation de suites de couches dans le même établissement que celui où votre enfant a été transféré.

La durée de cette hospitalisation post partum est indépendante de celle de votre enfant, et sera définie selon votre situation clinique en regard des durées moyennes de séjours standards en maternité recommandées par l'HAS :

- 72 heures après un accouchement par voie basse, pouvant aller jusqu'à 96 heures en fonction de votre état clinique,
- 96 heures après un accouchement par césarienne, pouvant aller jusqu'à 120 heures en fonction de votre état clinique.
- Si votre état clinique le permet, une sortie précoce est parfois proposée, indépendante de l'hospitalisation de votre enfant.

Lorsque la sage-femme transfert du RPO est sollicitée par votre maternité d'accouchement, elle contacte la maternité où a été transféré votre enfant pour s'informer de la **disponibilité d'un lit dans le secteur des suites de couches et organiser la continuité de votre prise en charge**.

Plusieurs cas de figure sont possibles :

- ✓ Si une place est disponible, la sage-femme transfert en informe votre maternité et le transport est organisé dans la journée.
- ✓ Si une place n'est pas disponible le jour-même, la demande peut être renouvelée le lendemain. Une permission de sortie pour aller voir votre enfant est envisageable sur accord de l'équipe médicale, selon votre situation clinique et respectant des consignes précises.
- ✓ Si votre transfert n'a pas été possible jusqu'au jour de votre sortie d'hospitalisation par manque de place, des solutions d'hébergements en dehors du secteur d'hospitalisation de maternité existent (cf annexes).

Réseau de Périnatalité Occitanie - SIREN : 841 258 650 00032 - N° d'organisme de formation : 76310931931 N° DPC : 9062  
Site Toulouse (Siège social) - Maison des réseaux - 24 impasse de la Flamèche - 31300 Toulouse  
Site Montpellier - Espace Henri Bertin Sans Bât A - 59 avenue de Fés - 34080 Montpellier

## Lettre d'information à destination des patientes lors des demandes de rappro- chements mère-enfant (CHU Montpellier)

Format : PDF - 3 pages

[Télécharger le document en cliquant ici](#)

## LETTRÉ D'INFORMATION A DESTINATION DES PATIENTES LORS DES DEMANDES DE RME (rapprochements mère-enfant)

Votre enfant a été transféré après sa naissance en service de néonatalogie au sein d'une maternité de type 3 du CH de Perpignan.

Un transfert pour **rapprochement mère-enfant peut être demandé auprès de la cellule transfert du RPO** par l'équipe de la maternité dans laquelle vous avez accouché, afin de poursuivre votre hospitalisation de suites de couches dans le même établissement que celui où votre enfant a été transféré.

La durée de cette hospitalisation post partum est indépendante de celle de votre enfant, et sera définie selon votre situation clinique en regard des durées moyennes de séjours standards en maternité recommandées par l'HAS :

- 72 heures après un accouchement par voie basse, pouvant aller jusqu'à 96 heures en fonction de votre état clinique,
- 96 heures après un accouchement par césarienne, pouvant aller jusqu'à 120 heures en fonction de votre état clinique.
- Si votre état clinique le permet, une sortie précoce est parfois proposée, indépendante de l'hospitalisation de votre enfant.

Lorsque la sage-femme transfert du RPO est sollicitée par votre maternité d'accouchement, elle contacte la maternité où a été transféré votre enfant pour s'informer de la **disponibilité d'un lit dans le secteur des suites de couches et organiser la continuité de votre prise en charge**.

Plusieurs cas de figure sont possibles :

- ✓ Si une place est disponible, la sage-femme transfert en informe votre maternité et le transport est organisé dans la journée.
- ✓ Si une place n'est pas disponible le jour-même, la demande peut être renouvelée le lendemain. Une permission de sortie pour aller voir votre enfant est envisageable sur accord de l'équipe médicale, selon votre situation clinique et respectant des consignes précises.
- ✓ Si votre transfert n'a pas été possible jusqu'au jour de votre sortie d'hospitalisation par manque de place, des solutions d'hébergements en dehors du secteur d'hospitalisation de maternité existent (cf annexes).  
Les sages-femmes du RPO restent disponibles en soutien aux équipes de maternité pour que vous puissiez bénéficier des informations nécessaires.

Réseau de Périnatalité Occitanie - SIREN : 841 258 650 00032 - N° d'organisme de formation : 76310931931 N° DPC : 9062  
Site Toulouse (Siège social) - Maison des réseaux - 24 impasse de la Flamèche - 31300 Toulouse  
Site Montpellier - Espace Henri Bertin Sans Bât A - 59 avenue de Fés - 34080 Montpellier

## Lettre d'information à destination des patientes lors des demandes de rappro- chements mère-enfant (CH Perpignan)

Format : PDF - 2 pages

[Télécharger le document en cliquant ici](#)



## LETTRÉ D'INFORMATION A DESTINATION DES PATIENTES LORS DES DEMANDES DE RME (rapprochements mère-enfant)

Votre enfant a été transféré après sa naissance en service de néonatalogie au sein du CHU de Nîmes.

Un transfert pour **rapprochement mère-enfant peut être demandé auprès de la cellule transfert du RPO** par l'équipe de la maternité dans laquelle vous avez accouché, afin de poursuivre votre hospitalisation de suites de couches dans le même établissement que celui où votre enfant a été transféré.

La durée de cette hospitalisation post partum est indépendante de celle de votre enfant, et sera définie selon votre situation clinique en regard des durées moyennes de séjours standards en maternité recommandées par l'HAS :

- 72 heures après un accouchement par voie basse, pouvant aller jusqu'à 96 heures en fonction de votre état clinique,
- 5 jours après un accouchement par césarienne,
- Si votre état clinique le permet, une sortie précoce est parfois proposée, indépendante de l'hospitalisation de votre enfant.

Lorsque la sage-femme transfert du RPO est sollicitée par votre maternité d'accouchement, elle contacte la maternité où a été transféré votre enfant pour s'informer de la **disponibilité d'un lit dans le secteur de gynécologie et organiser la continuité de votre prise en charge**.

Plusieurs cas de figure sont possibles :

- ✓ Si une place est disponible, la sage-femme transfert en informe votre maternité et le transport est organisé dans la journée.
- ✓ Si une place n'est pas disponible le jour-même, la demande peut être renouvelée le lendemain. Une permission de sortie pour aller voir votre enfant est envisageable sur accord de l'équipe médicale, selon votre situation clinique et respectant des consignes précises.
- ✓ Si votre transfert n'a pas été possible jusqu'au jour de votre sortie d'hospitalisation par manque de place, des solutions d'hébergements en dehors du secteur d'hospitalisation de maternité existent (cf annexes). A savoir qu'un lit d'appoint est disponible pour le co-parent dans chaque chambre de néonatalogie. Les sage-femmes du RPO restent disponibles en soutien aux équipes de maternité pour que vous puissiez bénéficier des informations nécessaires.

Réseau de Périnatalité Occitanie - SIREN : 841 258 650 00032 - N° d'organisme de formation : 76310931931 N° DPC : 9062  
Site Toulouse (Siège social) - Maison des réseaux - 24 impasse de la Flamèche - 31300 Toulouse  
Site Montpellier - Espace Henri Bertin Sans Bât A - 59 avenue de Fés - 34080 Montpellier

## Lettre d'information à destination des patientes lors des demandes de rappro- chements mère-enfant (CHU Nîmes)

Format : PDF - 2 pages

[Télécharger le document en cliquant ici](#)

## LETTRÉ D'INFORMATION A DESTINATION DES PATIENTES LORS DES DEMANDES DE RME (rapprochements mère-enfant)

Votre enfant a été transféré après sa naissance en service de néonatalogie ou réanimation au sein d'une maternité de type 3 du CHU de Toulouse.

Un transfert pour **rapprochement mère-enfant peut être demandé auprès de la cellule transfert du RPO** par l'équipe de la maternité dans laquelle vous avez accouché, afin de poursuivre votre hospitalisation de suites de couches dans le même établissement que celui où votre enfant a été transféré.

La durée de cette hospitalisation post partum est indépendante de celle de votre enfant, et sera définie selon votre situation clinique en regard des durées moyennes de séjours standards en maternité recommandées par l'HAS :

- 72 heures après un accouchement par voie basse, pouvant aller jusqu'à 96 heures en fonction de votre état clinique,
- 96 heures après un accouchement par césarienne, pouvant aller jusqu'à 120 heures en fonction de votre état clinique.
- Si votre état clinique le permet, une sortie précoce est parfois proposée, indépendante de l'hospitalisation de votre enfant.

Lorsque la sage-femme transfert du RPO est sollicitée par votre maternité d'accouchement, elle contacte la maternité où a été transféré votre enfant pour s'informer de la **disponibilité d'un lit dans le secteur des suites de couches et organiser la continuité de votre prise en charge**.

Plusieurs cas de figure sont possibles :

- ✓ Si une place est disponible, la sage-femme transfert en informe votre maternité et le transport est organisé dans la journée.
- ✓ Si une place n'est pas disponible le jour-même, la demande peut être renouvelée le lendemain. Une permission de sortie pour aller voir votre enfant est envisageable sur accord de l'équipe médicale, selon votre situation clinique et respectant des consignes précises.
- ✓ Si votre transfert n'a pas été possible jusqu'au jour de votre sortie d'hospitalisation par manque de place, des solutions d'hébergements en dehors du secteur d'hospitalisation de maternité existent (cf annexes). Les sages-femmes du RPO restent disponibles en soutien aux équipes de maternité pour que vous puissiez bénéficier des informations nécessaires.

Réseau de Périnatalité Occitanie - SIREN : 841 258 650 00032 - N° d'organisme de formation : 76310931931 N° DPC : 9062  
Site Toulouse (Siège social) - Maison des réseaux - 24 impasse de la Flamèche - 31300 Toulouse  
Site Montpellier - Espace Henri Bertin Sans Bât A - 59 avenue de Fés - 34080 Montpellier

## Lettre d'information à destination des patientes lors des demandes de rappro- chements mère-enfant (CHU Toulouse)

Format : PDF - 2 pages

[Télécharger le document en cliquant ici](#)



Réseau de  
Périnatalité  
Occitanie

**SITE DE MONTPELLIER**

Espace Bertin Sans - Bât A  
59 avenue de Fès  
34080 Montpellier

**SITE DE TOULOUSE**

24, impasse de la Flambère  
31300 Toulouse

**PÔLE TRANSFERTS TOULOUSE ET MONTPELLIER**

N°unique : 09 70 75 30 50 (08h - 20h et 7j/7j)  
transfertsRPO@perinatalite-occitanie.fr



[www.perinatalite-occitanie.fr](http://www.perinatalite-occitanie.fr)