

Compte-rendu de réunion :

Mise en place du dépistage néo-natal de la MCAD

Projet concerné	Dépistage Néonatal				
Auteur(s)	D Foissin, G Priolaud				
Version	1	Date de la réunion	30/11/2020	Etat	Document de travail
Participants	<i>Structure</i>		<i>Participants</i>		
	CRDN		Dr Oliver, Dr Ausseil , S Bellido , B Charbonnier		
	RPO		D Foissin ; J Coquenas, G Priolaud		
	Etablissements		Clinique Boyé : A Favot Cadre Sage-Femme Hôpital Joseph Ducuing : Dr I Girard Pédiatre CHU Perpignan : Mme Vives Polyclinique Méditerranée CHU De Montpellier : Mme Sandrine Estrabeaud cadre maternité CH Mende : Tala Douski CH Albi : Julia Di Piazza Cadre Clinique Kennedy Nîmes : Mme Jacquemont CHU Nîmes Caremeau : Mme F Chapuy cadre Suites de couches Clinique Grand Sud : Mme V Lyon URPSSF : Françoise Prido Clinique Champeau Clinique Clemenville : Mme Sarah Jousseau Cadre SF UMPA : ??? CH Rodez ? CH Auch : Me Bonnafous Anne Cadre Néonat CH Castres : Dr J Raignoux CH Carcassonne :		
Excusés					

I. Objectif

Mise en place du dépistage de la MCAD en Occitanie à partir du 1^{er} décembre.

II. Contexte

Dépistage d'une 6^{ème} maladie : MCAD qui sera suivie dans les mois qui viennent par le dépistage d'autres maladies métaboliques.

Le flyer pour l'information aux parents a été envoyé la semaine dernière par le CRDN. Il est à intégrer au document relatif aux dépistages du nouveau-né en maternité.

Association Loi 1901 - N° de Siret 841 258 650 00016 - N° d'organisme de formation 76310931931 - N° DPC 9062 - www.perinatalite-occitanie.fr

Siège : Maison des Professions de Santé – 9 avenue Jean Gonord - 31500 TOULOUSE

Site Ouest

24 Impasse de la Flambère
31300 TOULOUSE
05 67 31 21 00

Site Est

Espace Henri Bertin Sans
Bat A – 59 avenue de Fès
34080 MONTPELLIER
04 67 04 01 53

En 2021, un dépliant intégrera toutes les maladies.

Pas de changement au niveau du buvard, le labo fait le dépistage sur la zone de la phénylcétonurie ;

Attention :

- Respecter les jours de prélèvement (J3) , pour diminuer les faux positifs
- Envoi du buvard rapidement car il y a un risque de décompensation précoce.

Rappel aux SFL : elles sont responsables de l'envoi du buvard (ne jamais confier celui-ci aux parents)

III. Questions

- HJD : Dépistage précoce à H48 ? il faut préférer J3 et non H48 faux positifs
- Ne pas mettre de la SHA avant le dépistage : toucher le buvard avant du gel risque de faire des interférences, buvard manipulé avec les gants
- Ideal le faire sécher un peu, l'important est que la tache de sang traverse le buvard
- Sang direct ok mais les normes sont établies sur un dépistage sur sang capillaire
- Ne pas extraire les gouttes de sang d'un tube de prélèvement
- L'hospitalisation d'un nouveau-né atteint se fait dans un centre de référence : CHU Toulouse ou Montpellier

En cas de questions vous pouvez joindre le centre de dépistage par mail au :

CRdepistageneonat.occitanie.coordin@chu-toulouse.fr

Site Ouest

24 Impasse de la Flambère
31300 TOULOUSE
05 67 31 21 00

Site Est

Espace Henri Bertin Sans
Bat A – 59 avenue de Fès
34080 MONTPELLIER
04 67 04 01 53

Association Loi 1901 - N° de Siret 841 258 650 00016 - N° d'organisme de formation 76310931931 - N° DPC 9062 - www.perinatalite-occitanie.fr

Siège : Maison des Professions de Santé – 9 avenue Jean Gonord - 31500 TOULOUSE

Site Ouest

24 Impasse de la Flambère
31300 TOULOUSE
05 67 31 21 00

Site Est

Espace Henri Bertin Sans
Bat A – 59 avenue de Fès
34080 MONTPELLIER
04 67 04 01 53