



Dépistage néonatal des troubles de l'audition en Occitanie: bilan de l'année 2020

Journée régionale du dépistage néonatal des troubles de l'audition 10 septembre 2021







2018	2019	2020	2021
27/03/2018 28/05/2018 31/08/2018 11/10/2018 07/12/2018	01/03/2019 28/03/2019 12/04/2019 17/05/2019 13/06/2019 28/06/2019 05/07/2019 26/08/2019 25/09/2019 15/11/2019 13/12/2019	24/01/2020 20/02/2020 24/04/2020 30/04/2020 27/05/2020 04/06/2020 10/06/2020 23/06/2020 26/06/2020 17/09/2020 06/10/2020	12 /01/2021 19/01/2021 09/02/2021 16/02/2021 02/03/2021 30/03/2021 06/04/2021 04/05/2021 18/05/2021 01/06/2021 08/06/2021
		10/11/2020 24/11/2020 01/12/2020 08/12/2020	15/06/2021 10/08/2021 16/08/2021 02/09/2021
5	11	15	15

- Journée régionale du dépistage 10 septembre 2020 à Toulouse
- Protocole commun de dépistage
 - Déploiement du T3 en Occitanie Est
 - Exhaustivité inconstante
 - 4 maternités « réfractaires »
 - Rôle crucial pour limiter les perdus de vue durant la crise sanitaire COVID 19
 - Généralisation du T2 par PEAA en Occitanie Ouest
 - En cours
 - 8 maternités non équipées
- Cahier des charges régional Occitanie
- BASE DE DONNEES commune++++




Uniformisation des outils de communication

- Annuaire commun des ORL référents
- Plaquette d'information
- Lettre aux praticiens assurant le suivi des enfants
- Lettre d'information aux parents pour préparation
 - Au test différé de dépistage (T3)
 - Aux tests diagnostiques
- Système de rappel par sms

En cours

- Poster commun
- Charte commune de bonnes pratiques des ORL référents













Enregistrement de plusieurs vidéos de e learning:
 https://www.perinatalite-occitanie.fr/apres-la-naissance/depistage-des-troubles-de-laudition-du-nouveau-ne



Sommaire de la vidéo (Timeline) 0:04: Le protocole de dépistage néonatal des troubles de l'audition en Occitanie 2:59: Fonctionnalités du boîtier AccuScreen 8:17: Utilisation de la base AccuScreen 9:27: Entretien de la sonde d'otoémission 11:04: Test OEA 14:08: Test PEAA 22:54: Test PEAA avec casque 23:45: Que dire aux familles? 26:38: Décharger AccuScreen 29:19: Extraction de la base de données AccuLink 35:22: Autre recueil de données: le buvard du test de Guthrie 36:25: Installation AccuLink

Collaborations au niveau national

- Publication dans le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire avec Santé publique France
- Plateforme d'échanges Talkspirit avec les autres acteurs nationaux du dépistage
- Réunion avec la DGOS prévue le 18 octobre 2021

> ARTICLE // Article

LE DÉPISTAGE UNIVERSEL DE LA SURDITÉ PERMANENTE BILATÉRALE NÉONATALE EN FRANCE : ÉVALUATION DE SON DÉPLOIEMENT APRÈS DEUX ANNÉES DE FONCTIONNEMENT

// UNIVERSAL SCREENING FOR PERMANENT NEONATAL BILATERAL DEAFNESS IN FRANCE: EVALUATION TWO YEARS AFTER NATIONAL DEPLOYMENT

Alexandra Doncarli (alexandra.doncarli@santepubliquefrance.fr)¹, Hélène Tillaut², Mohamed Akkari³.⁴, Blandine Baladi⁴.⁵, Margaux Creutz-Leroy⁶, Marine Parodi³, Nathalie Beltzer¹, Véronique Goulet¹, Nolwenn Regnault¹


- ¹ Santé publique France, Saint-Maurice
- ² Univ Rennes, Inserm, EHESP, Irset (Institut de recherche en santé environnement et travail), UMR_S 1085, Rennes
- ³ Département d'ORL et chirurgie cervico-faciale, UAM d'ORL pédiatrique, Hôpital Gui-de-Chauliac, CHU de Montpellier
- ⁴ Réseau de périnatalité Occitanie, Montpellier & Toulouse
- ⁵ Service d'oto-rhino-laryngologie, Hôpital Pierre Paul Riquet, CHU Purpan, Toulouse
- 6 Réseau périnatal lorrain, Nancy
- ⁷ Service d'oto-rhino-laryngologie pédiatrique et de chirurgie cervico-faciale pédiatrique, CRMR MALO, CHU Necker-Enfants Malades, AP-HP, Paris

Indicateurs régionaux et d'évaluation Santé Publique France



→ Vocabulaire commun

Principaux indicateurs régionaux à transmettre à SpF/Indicateurs d'évaluation du déploiement du programme de dépistage de la surdité permanente bilatérale néonatale



Indicateur	Définition	Remarques
0	Nombre de naissances vivantes	exclut les MFIU et IMG
1	Nombre de naissances vivantes saisies par les maternités qui pratiquent le dépistage=indicateur0-1a-1b	exclut les naissances à domicile et les nés vivants décédés avant test
1 a	Nombre de naissances à domicile	font l'objet d'une diapo à part sur le logigramme
1b	Nombre de nés vivants décédés avant test	sert au calcul de l'indicateur 1
2	Nouveau-nés couverts par le dépistage =4+5+7a	inclut les refus de dépistage. A terme, l'indicateur 2 sera égale à l'indicateur 1 s'il n'y a plus d'échappements au dépistage
2 a	Nouveau-nés à tester hors refus =1-7a	correspond aux nouveau-nés elligibles moins les refus initiaux
2b	Nouveau-nés ayant été testés	
2c	Nouveau-nés ayant eu comme premier test OEA	
2d	Nouveau-nés ayant eu comme premier test PEAA	permet d'identifier indi <mark>rectement</mark> les enfants de néonat
2e	Nombre de protocoles complets (suspects et non suspects)=3d+4c	

Indicateur SPF
Indicateur RPO

3	Nombre d'enfants suspects de SPN éligibles au suivi après test et retest=3a+3b	Rappel: en Occitanie, retest=T2=obligatoirement PEAA. Cet indicateur comprend les décédés après test suspect. Une partie de ces enfants va avoir un T3, et alimenter l'indicateur 5
3a	Nombre d'enfants suspects de SPN après test retest en maternité sans test à distance (T3)	T1 suivi de T2
3b	Nombre d'enfants suspects de SPN après test retest en maternité ayant bénéficié d'un test à distance (T3)	T1 suivi de T2 suivi de T3
3c	Nombre d'enfants suspects de SPN après 1er test=5a+2e	inclut ceux qui vont avoir un T2, et ceux qui auront un protocole incomplet
3d	Nombre d'enfants suspects de SPN après 1er test ayant bénéficié d'un protocole complet (T2 par PEAA)	


Indicateur SPF Indicateur RPO

4	Nombre d'enfants non suspect de SPN y compris contrôle à distance=4a+4d+4e+4f		
4a	Nombre d'enfants non suspect de SPN après dépistage en maternité seulement=4b+4c	T1 et/ou T2 sans T3	
4b	Nombre d'enfants non suspect de SPN dès le premier test en maternité (ou si T2 par OEA)	rassurant dès le T1 (OAE + PEAA)	
4c	Nombre d'enfants non suspect de SPN après protocole complet en maternité	T1 douteux, T2 par PEAA rassurant	
4d	Nombre d'enfants non suspect de SPN après dépistage en maternité avec protocole complet douteux et T3 rassurant	T1 et T2 douteux, T3 rassurant	
4e	Nombre d'enfants non suspect de SPN après dépistage en maternité douteux mais protocole incomplet (pas de T2 par PEAA) et T3 rassurant	T1 douteux, pas de T2, T3 rassurant	
4f	Nombre d'enfants non suspect de SPN à l'issu d'un T3 seulement (pas de dépistage en maternité)		


Indicateur SPF
Indicateur RPO

5	Nombre d'enfants suspects de SPN y compris contrôle à distance=5a- 4e+5c+5d+5e			
5a	Nombre d'enfants considérés comme suspects de SPN avec depistage incomplet en mater (1 seul test)	C'est-à-dire seulement T1, ou (spécifique à Occitanie) T2 fait par OEA. Pour les maternités non équipées de PEAA, ne pas donner cet indicateur car pourrait être mal vécu		
5b	Nombre d'enfants avec 1 seule oreille testée et jugé "a surveiller" avec dépistage incomplet (1 seul test en maternité)	normalement, ce cas de figure n'existe pas en Occitanie		
5c	Nombre d'enfants suspects de SPN après dépistage en maternité et T3=5f+5g	•	ui sont restés s après T3	S
5d	Nombre d'enfants suspects de SPN après dépistage en maternité avec protocole complet sans T3	doit tendre vers 0		
5e	Nombre d'enfants suspects de SPN après T3 uniquement (pas de dépistage en maternité)			
5f	Nombre d'enfants suspects de SPN après protocole incomplet en maternité et T3			
5g	Nombre d'enfants suspects de SPN après protocole complet en maternité et T3			

Indicateur SPF Indicateur RPO



Indicateurs régionaux RPO: logigramme




Indicateurs régionaux RPO: logigramme

N=158

+5 sans

seuils



Indicateurs d'évaluation RPO

Indicateurs	Occitanie
TAUX D'EXHAUSTIVITÉ (=EFFICIENCE dans notre région) =indicateur 2/indicateur 1	99,1%
TAUX DE DEPISTAGE NON SOUHAITE =indicateur 7a/indicateur 1	0,17%
TAUX DE SUSPECT DE SURDITE Après T1/T2 =indicateur 3/indicateur 2	2,75%
TAUX DE SUSPECT DE SURDITE Après T1/T2/T3 =indicateur 5/indicateur 2	2,5%
VALEUR PREDICTIVE POSITIVE =indicateur 11e/indicateur 5	46%

Indicateurs d'évaluation RPO

Indicateurs	Occitanie
TAUX DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS SUSPECTS =indicateur 11/indicateur 5	58,2%
TAUX DE PERDUS DE VUE =indicateur 8/indicateur 5	41,8%
PREVALENCE DE LA SURDITE légère à totale =indicateur 11d/indicateur 2	0,29%
PREVALENCE DE LA SURDITE moyenne à totale =indicateur 11e/indicateur 2	0,11%

Objectifs

- Taux d'exhaustivité>99%
- Taux de réalisation de protocole complet (T1 par OEA ou PEAA/T2 par PEAA) avant la sortie de la maternité à 100%
- Généralisation du T3 (PEAA) après la sortie de la maternité
- Taux de perdus de vue <20%

Merci de votre attention

